

بررسی فراوانی ضایعات و اقدامات درمانی در مصدومین زلزله به ارجاع شده به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران

حسنعلی محبی^{۱*}، M.D.، سیدحامد حسینی^{۲**}، M.D.، شعبان مهروز^{۳***}، M.D.، فرزاد پناهی^{۴****}، M.D.
یونس پناهی^{۴****}، M.D.، یاشار محزمزاد^{۵*}، M.D.

آدرس مکاتبه: * دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) - مرکز تحقیقات ترومما - تهران - ایران

* دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) - دانشکده پزشکی - گروه جراحی

** دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) - مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی

چکیده

مقدمه: در سحرگاه روز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۸۲، زمین لرزه مخربی شهر به و روستاهای پیرامون را تخریب کرد. در این رویداد رحدود ۴۰۰۰ نفر کشته و مجرح گردیدند. دانستن شدت آسیب و نوع مشکلات مصدومینی که از زلزله بر جای مانده‌اند در پیش‌بینی اقدامات درمانی مورد نیاز ضروری است.

روش مطالعه و اجرا: این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی (Descriptive Cross-Sectional) و با استفاده از پرونده مصدومان ارجاع شده زلزله به که در بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران بستری شده بودند، انجام گرفته است. داده‌های دموگرافیک، عوارض، تشخیص، نوع آسیب، اطلاعات مربوط به پذیرش، ترخیص و انتقال، عالیم حیاتی، سطح هوشیاری، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام گرفته در اورژانس و بخش و نتیجه نهایی توسط پرسشنامه گردآوری شد. با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی، توسط نرم‌افزار SPSS^{۱۳} تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است.

نتایج: از تعداد ۸۵۴ نفر از مصدومین بررسی شده، ۵۱۰ نفر (۵۹٪) در بیمارستانهای غیرنظامی و ۳۴۴ نفر (۴۰٪) در بیمارستانهای نظامی و در مجموع ۵۴٪ آنها مذکور بودند. شایعترین اقدام درمانی در اورژانس، ثابت کردن اندام در ۳۸۹ نفر (۳۹٪) از میان ۹۴۵ آسیب ایجاد شده، شایعترین ضایعه در مصدومین را شکستگی اندام تحتانی در ۲۹۱ مورد (۸٪) تشکیل می‌داد. در ۲۴۲ مصدوم اقدامات جراحی انجام شد. ۳۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. میانگین ISS در مصدومین ۷/۷ بود و ۱۱/۹٪ دارای ISS بالاتر از ۱۵ (تروما شدید) بودند.

بحث: با توجه به پیدایش درصد زیادی از آسیب‌های ارتوپدیک در اندامها و لگن در مصدومین ارجاع شده، پیش‌بینی انجام اقدامات پاراکلینیکی به خصوص در تصویرنگاری و آمادگی بیمارستان‌های مناطق دورتر جهت درمان مشکلات ارتوپدیک، از نکات مهم در مدیریت چنین بحرانی می‌باشد.

واژگان کلیدی: زلزله، به، ترومما، شدت آسیب

۱- دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج) - نویسنده مسئول

۲- پژوهش عمومی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

۳- دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

۴- استادیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)

مقدمه

در این مطالعه به ارزیابی فراوانی ضایعات و صدمات و بررسی اقدامات درمانی در مصدومین آسیب دیده از زلزله بم و انتقال یافته به بیمارستانهای نظامی و برخی بیمارستانهای غیرنظامی تهران پرداخته شده است.

مواد و روش کار

در طی این مطالعه توصیفی- مقطوعی (Descriptive Cross-Sectional)، آسیب دیدگان زلزله بم که در زمستان ۱۳۸۲ جهت انجام اقدامات تشخیصی و درمانی کامل‌تر به بیمارستان‌های تهران ارجاع شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بیمارستان‌های مورد بررسی شامل بیمارستان‌های ناجای شماره ۲۶ و ولی عصر(عج) از بیمارستان‌های نیروی انتظامی، بعثت، خانواده، گلستان نیروی دریایی، ۵۰۱ ارتش، ۵۰۲ ارتش، چمران، فجر، و ۵۰۵ ارتش از بیمارستان‌های ارتش و بیمارستان‌های بقیه ا... «عج» و نجمیه از بیمارستان‌های سپاه بودند. بیمارستان‌های غیرنظامی نیز شامل بیمارستان‌های میلاد، رسول اکرم «ص»، امام خمینی «ره»، لقمان، بهارلو، شریعتی و سینا بودند. اطلاعات مربوط به بیماران Glasgow Coma شامل علایم حیاتی و وضعیت هوشیاری (Scale)، ضایعات ایجاد شده در نواحی مختلف آناتومیک و اقدامات درمانی انجام شده در اورژانس و بخش بیمارستان، تشخیص نهایی بیمار هنگام ترخیص توسط مجریان طرح و با استفاده از پروندهای پزشکی بیماران ثبت و در فرم جمع‌آوری اطلاعات وارد گردید. علاوه‌بر اطلاعات ذکر شده، شدت ترومای وارد به هر بیمار نیز با استفاده از شاخص Injury Severity Score (ISS) محاسبه گردید. این سیستم بر پایه تقسیمات بدن به شش منطقه ویژه شامل: توراکس، شکم و لگن احتشایی، سر و گردن، صورت، لگن استخوانی و اندامها و سطوح خارجی بدن انجام می‌شود. روش محاسبه آن به این صورت است که به هر قسمت از اعضای فوق براساس شدت و نوع آسیب، بالاترین نمره که براساس جدولی تحت عنوان Abbreviated Injury Scale (AIS) داده می‌شود، انتخاب شده و از بین آنها ۳ نمره بالایی را مشخص و مربع هر یک با هم جمع می‌شود [۹]. این عدد انتهایی رقمی بین

بحranهای طبیعی یا بحران‌های ناشی از فناوری‌های بشری ممکن است گریبانگیر هر جامعه‌ای در هر زمانی بشوند و باعث مرگ، ناتوانی، بیماری و از بین رفتن امکانات، منازل و تجهیزات گرددند. در این میان زلزله به عنوان یک بلاعی طبیعی هر ساله باعث مرگ هزاران نفر در سراسر دنیا می‌شود [۱،۲]. از این حیث کشور ما جزء کشورهای پرخطر محسوب می‌شود. ایران به علت موقعیت جغرافیایی خاص و قرار گرفتن روی کمریند خطوط گسل جزء ده کشور اول زلزله خیز و از نظر وقوع بلاعی طبیعی چهارمین کشور جهان محسوب می‌شود و هر چند سال یک زلزله بزرگ با درجه ریشتر بالا در آن رخ می‌دهد، مانند زلزله طبس در سال ۱۳۵۷ با ۱۹۶۰۰ کشته، زلزله روبار- منجیل در سال ۱۳۶۹ با ۳۵۰۰۰ کشته و زلزله بم [۱-۵]. سحرگاه روز جمعه ۵ ماه ۶/۱۳۸۲، در ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه زمین لرزه مخربی با بزرگی ۱۳۸۳ درجه در مقیاس ریشتر، شهر بم و روستاهای پیرامون آن را به تلی از خاک تبدیل کرد. در این رویداد ۲۶۷۱ نفر (مرکز آمار ایران [۶] و یا ۴۰۰۰ نفر (براساس گزارش فرمانداری بم) از جمعیت ۱۴۲۰۰۰ نفری شهر بم و روستاهای اطراف آن کشته شدند. تعداد زخمی‌ها حدود ۲۰ هزار نفر بود که ۴ هزار نفر به کرمان، ۲۲۰۰ نفر به تهران، ۶۲۵۰ نفر به اصفهان و ۶۶۸ نفر به شیراز انتقال یافتند [۷]. در هر زلزله به دلیل فرو ریختن بنای و قرار گرفتن مصدومین در زیرآوارها، صدمات و ضایعاتی بر مردم منطقه وارد می‌شود. این آسیب‌ها می‌توانند از خراش‌های سطحی تا مرگ را شامل شوند. دانستن مکانیسم ترومای و نوع مشکلات مصدومینی که از زلزله بر جای مانده‌اند، در پیش‌بینی اقدامات درمانی مورد نیاز ضروری است [۸]. از طرف دیگر اقدامات تشخیصی و نتایج درمانی این افراد با توجه به شدت ضایعه و میزان بهبودی مورد انتظار آن، می‌تواند میزان کارآیی کادر درمانی را در هر مرکز تا حدودی مشخص کند. بدیهی است این ارزیابی پیوسته مورد نیاز بوده و جهت بهبود کیفیت خدمات، شاخص‌هایی بهدست می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان در جهت افزایش کیفیت خدمات درمانی اقدام نمود.

۵۶۳ بیماری که GCS در پروندهای آنها قید شده بود، ۶ نفر GCS معادل ۸ و کمتر، ۱۹ نفر بین ۹-۱۳ و ۵۳۸ نفر GCS معادل ۱۴ یا ۱۵ داشتند. مصدومین پس از ارجاع به بیمارستان‌های تهران، ابتدا در اورژانس تحت درمان‌های اولیه قرار گرفتند که شایع‌ترین آن ثابت کردن اندام در ۳۸۹ نفر (۳۹/۹٪) بود (جدول ۱). پس از ثابت شدن وضعیت بالینی، معمولاً در بخش‌های بیمارستانی بستری و اقدامات درمانی در مورد آنها ادامه یافته است (جدول ۲). در بررسی های انجام شده مشخص گردید که مسکن‌های مخدر (مورفین و پتیدین) در ۶۵/۴٪ از مصدومین مورد استفاده قرار گرفته که از این حیث شایع ترین داروی مصرفی بوده است. ۲۴۲ نفر (۲۸/۳٪ کل) تحت انواع اعمال جراحی قرار گرفتند. شایع‌ترین عمل جراحی مربوط به جراحی‌های ارتوپدی در ۱۷۴ مورد (٪۷۲) و سپس جراحی عمومی (۱۱/۲٪) بود (جدول ۳). البته اگر انجام آمپوتاسیون را نیز به عنوان نوعی عمل جراحی ارتوپدی در نظر بگیریم تعداد کل اعمال جراحی به ۲۶۳ مورد و جراحی‌های ارتوپدی به ۱۹۵ مورد (٪۷۴٪) می‌رسد.

جدول ۲: اقدامات درمانی انجام شده جهت مصدومین زلزله بهم در بخش بیمارستانهای تهران

درصد	تعداد درمان	نوع درمان
۶/۰	۱۴۴۴	دارو درمانی
۱۹/۷	۴۷۰	مایع درمانی
۱/۶	۳۹	هپارین
۲/۶	۶۲	ترریق خون
۱/۹	۴۶	تراکشن پوستی
۲/۴	۵۷	فیزیوتراپی
۱۰/۲	۲۴۲	اعمال جراحی
۰/۸۸	۲۱	آمپوتاسیون
۱۰۰	۲۳۸۱	مجموع

۱-۷۵ می‌باشد که کمتر از ۸ خفیف (mild)، بین ۸ تا ۱۵ متوسط (moderate) و بالای ۱۵ شدید (severe) تلقی می‌شود [۱۰]. پس از جمع‌آوری اطلاعات، شاخصهای توصیفی شامل فراوانی، میانگین، میانه، انحراف معیار، به کمک نرم‌افزار آماری SPSS 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

تعداد ۸۵۴ مصدوم مورد مطالعه قرار گرفتند که تعداد مصدومین بررسی شده در بیمارستان‌های نظامی و غیر نظامی به ترتیب شامل ۳۴۴ نفر (۴۰/۳٪) و ۵۱۰ نفر (۵۹/۷٪) بود. از تعداد کل مصدومین ۴۶۷ نفر (۵۴/۷٪) مرد بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه (SD: ۱۴/۳۵ ± ۲۹/۰۳ سال بود (حدوده ۱ الی ۸۳ سال).

جدول ۱: اقدامات درمانی انجام شده جهت مصدومین زلزله بهم در اورژانس بیمارستانهای تهران

درصد	تعداد درمان	نوع درمان
۰/۸۲	۸	CPR
۲/۳۶	۲۳	راه هوایی
۷/۸	۷۶	جلوگیری از خونریزی
۳۳/۳	۳۲۴	مایع درمانی
۸/۲	۸۰	اکسیژن درمانی
۳۹/۹	۳۸۹	ثبت کردن اندام
۷/۸	۷۶	ثبت کردن ستون فقرات
۱۰۰	۹۷۴	مجموع

میانگین فشار سیستول و دیاستول مجرحین در بد و ورود به ترتیب ۱۱۲/۹ و ۷۱ میلی‌متر جیوه بود که حداقل و حداکثر آن در مورد فشار سیستول به ترتیب ۷۰ و ۲۰۰ میلی‌متر جیوه و در مورد فشار دیاستول ۴۰ و ۱۱۰ میلی‌متر جیوه بود. میانگین ضربان قلب و تعداد تنفس نیز به ترتیب ۸۵/۵ و ۱۹/۴ در دقیقه بود. نفر (٪۱۸٪) ضربان قلب بیشتر از ۱۰۰ بار در دقیقه داشتند. از بین

جدول ۳: فراوانی اعمال جراحی انجام شده در مصدومین زلزله به در بیمارستان های تهران

	جراحی عروق	جراحی چشم	جراحی زنان	جراحی توراکس	جراحی ترمیمی	جراحی فک و صورت	جراحی اعصاب	جراحی عمومی	جراحی ارتوپدی	نوع عمل
۲۴۲	(٪۰/۷۲)۲	(٪۰/۳۶)۱	(٪۰/۳۶)۱	(٪۰/۳۶)۳	(٪۰/۷۲)۲	۱۵(٪۶/۱)	(٪۰/۷)۱۷	(٪۱۱/۲۷)	(٪۰/۷۲)۱۷۴	تعداد (درصد)

جدول ۴: انواع آسیب های تشخیص داده شده در مصدومین زلزله به ارجاع یافته به بیمارستان های تهران به تفکیک نواحی مختلف آناتومیک

ناحیه	عضو	نوع آسیب	تعداد (درصد)
اندام و لگن استخوانی	اندام تحتانی	شکستگی	(٪۰/۳۰)۲۹۱
		دررفتگی	(٪۰/۰/۲۱)۲
		آسیب نسج نرم	(٪۱۳/۵)۱۲۸
		شکستگی	(٪۰/۸/۰)۷۸
	اندام فوقانی	دررفتگی	-----
		آسیب نسج نرم	(٪۰/۵/۶)۵۳
		شکستگی	(٪۱۱/۰)۱۰۶
	لگن استخوانی	دررفتگی	(٪۰/۰/۳۱)۳
		آسیب نسج نرم	(٪۰/۲/۰)۲۱
		شکستگی	(٪۰/۰/۷۸)۷۴
ستون فقرات	ستون فقرات	آسیب نسج نرم	(٪۰/۳/۷)۳۵
		شکستگی	(٪۰/۰/۸)۰۲۷
	فك و صورت	آسیب نسج نرم	(٪۰/۱/۳۷)۱۳
		شکستگی	

مصدومین ۱۴ نفر طی بستری فوت نمودند که ۱۱ نفر در ICU بستری بودند.

از کل مصدومین مورد مطالعه، ۳۸ مصدوم (٪۴/۵) نیاز به بستری در ICU پیدا کردند. از این تعداد ۲۲ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودند. میانگین مدت اقامت در ICU $12/1\pm 3/62$ روز بوده که کمترین و بیشترین مدت بستری به ترتیب ۱ و ۷۲ روز می باشد.

بحث

در طول ۲۰ سال گذشته حادثه های طبیعی در سراسر جهان بیش از سه میلیون زندگی را گرفته و به ۸۰۰ میلیون نفر آسیب رسانده است و بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت مالی ناشی از این آسیب ها می باشد. در میان مخاطراتی که حیات انسان را تهدید می کنند، زمین لرزه آسیب رسان ترین حادثه طبیعی است [۱۱].

زلزله به قریب به ۴۰۰۰۰ کشته و زخمی تلفات غیر قابل مقایسه ای نسبت به زلزله های مشابه در نواحی دیگر داشت. در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ یعنی درست یک هفته قبل از حادثه بهم، زلزله ای با شدت مشابه در کالیفرنیا اتفاق افتاد که فقط زندگی ۲ نفر را گرفت

بجز در ۳ مورد که تشخیص نهایی در پرونده ذکر نشده بود، در سایر مصدومین، از تعداد ۸۵۱ بیمار، در مجموع ۹۴۵ مورد آسیب وجود داشت که شایعترین آن مربوط به شکستگی اندام تحتانی در ۷۹۱ مورد (٪۳۰/۸) بود. نحوه پراکندگی این آسیبها در نواحی مختلف آناتومیک در جدول ۴ آمده است. طبق ارزیابی انجام شده، در ۷۹۱ مورد امکان تعیین و نمره دهی شدت آسیب بر اساس معیار ISS وجود داشت که در مجموع، ۴۹۰ نفر (٪۶۱/۹) دچار ترومای خفیف، ۲۰۷ نفر (٪۲۶/۲) ترومای متوسط و ۹۴ نفر (٪۱۱/۹) دچار ترومای شدید بودند. در مجموع میانگین ISS برابر با $7/7\pm 5/27$ بود. در بین

تروما به قفسه سینه با ISS=۲۵ به عنوان یک فاکتور با پیش‌آگهی بد طبقه بندی شده است [۱۳].

در باب ISS و ارتباط آن با تشخیص و درمان مصدومین آسیب دیده از زلزله، این نکته حائز اهمیت است که با محاسبه این فاکتور به عنوان یک اندکس با اهمیت، می‌توان به اولویت‌بندی و نگاه درمانی با ارزشی دست یافت. در مطالعه پیک‌آسا، ISS در مصدومین بستری شده در بیمارستان از ۱ الی ۲۶، ولی در افراد متوفی از ۴ الی ۷۶ و بطور متوسط ۱۰ برابر بوده است که نشان‌دهنده وجود ارتباط ISS بالا با مرگ و میر بیشتر می‌باشد [۱۱].

با توجه به فاصله مکانی زیاد محل حادثه تا بیمارستانهای شهر تهران که حدود ۱۰۰۰ کیلومتر می‌باشد، کم بودن مصدومین با ترومای شدید قابل توجیه می‌باشد.

نحوه تریاژ و انتخاب بیماران برای انتقال به مراکز درمانی شهرهای معین در بردههای زمانی بعد از زلزله می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. در ساعات اول به واسطه نبود سازمان و نظام مشخص، ممکن است بیماران بدون اولویت‌بندی انتقال یابند. بنابراین با شکل‌گیری اولیه تریاژ، بیماران بدخل‌تر به مراکز درمانی نزدیک‌تر از جمله کرمان و بیماران با حال مساعد به شهرهای دورتر از جمله تهران انتقال یافتنند. در نتیجه بیماران مورد مطالعه به لحاظ همگن بودن و خامت مصدومیت از توزیع متفاوتی تعیین می‌کردند.

در پایان باید تأکید نمود که مدیریت درمانی مصدومین زلزله باید بر اساس پروتکل‌های از پیش تعیین شده و بر اساس تامین نیروها و منابع و رعایت اصول تریاژ، برای رسیدگی به ضایعات متعدد به خصوص آسیب‌های ارتپیدی در نواحی دور از حادثه برنامه ریزی شود.

منابع

- ۱- عراقی زاده ح، ثقیل‌نیا، انتظاری و. بررسی مدیریت امداد و درمان در حوادث غیر مترقبه موروری بر زلزله به. مجله طب نظامی، زمستان ۱۳۸۲، سال پنجم، شماره ۴، ص. ۲۵۹.
- ۲- سازمان هلال احمر ایران. امدادگران ایران. سایت اینترنتی مرکز آموزش و تحقیقات هلال احمر ایران. قابل دسترسی در WWW.Emdadgar.com. تاریخ مراجعته تابستان ۱۳۸۴.

[۱۲]

چندین علت در این امر دخیل بوده است نوع زلزله، ساختار ساختمان‌ها، زمان زلزله، نبودن سرویس‌های درمانی محلی مناسب، مشکلات منطقه‌ای، جغرافیایی و محیطی که همگی باعث افزایش بسیار بالای مرگ و میر شدنند.

مصدومین مطالعه شده نشان دهنده وضعیت کلی مصدومیت در جریان زلزله به نیستند زیرا بیماران بررسی شده در این مطالعه صرفاً از بین افرادی انتخاب شده بودند که در بیمارستان‌های شهر تهران تحت مداوا قرار گرفته‌اند و اطلاعات به دست آمده نیز محدود به همین گروه می‌باشد. از دیگر محدودیت‌های موجود در این مطالعه، عدم امکان به دست آوردن اطلاعات دقیق از بیماران در مورد اقدامات درمانی انجام شده از زمان زلزله تا رسیدن به بیمارستان‌های مورد نظر ما بوده است.

میانگین فشارخون سیستول و دیاستول ایشان در بدو ورود به بیمارستان طبیعی و تعداد تنفس و بعض آنها نیز نزدیک به محدوده طبیعی بوده است. مجموعه این عوامل نشان‌گر آن است که هیچیک از موارد فوق قادر به تعیین پیش‌آگهی خوب نمی‌باشد بنابراین پایش دقیق عالیم حیاتی مصدومین و انجام معاینات و ارزیابی مکرر در کلیه مراحل درمانی بایستی به دقت انجام گیرد.

براساس مطالعه انجام گرفته، بیشتر اعمال جراحی انجام شده در زمینه مشکلات ارتپیدی می‌باشد و ۱۷۴ جراحی از ۲۴۲ عمل در این قسمت صورت گرفته است. در مطالعه پیک آسا مربوط به زلزله ۱۹۹۴ لوس‌آنجلس نیز بیشتر آسیب‌ها در اندام‌ها بوده است [۹]. این نکته اهمیت پیش‌بینی اعمال جراحی و امکانات پرسنلی و تجهیزاتی برای مواجهه با بحران‌های طبیعی گسترش در مراکز درمانی را بیش از پیش نمایان می‌کند. بررسی دقیق افرادی که سرنوشت‌شان به مرگ منجر شده است، در چنین حوادثی از اهمیت بالایی برخوردار است. در مطالعه حاضر میانگین سنی افراد فوت شده $15/5 \pm 30$ سال گزارش شده است که طیف آن بین ۱۸ تا ۵۷ سال بوده‌اند.

در این مطالعه میانگین ISS برابر با ۶,۷ بود و ISS بالاتر از ۱۵ که نشان دهنده ترومای شدید است در ۱۱/۹٪ از مصدومین بدست آمد. طبق مطالعه‌ای که Toker و همکارانش در زلزله ۱۹۹۹ مرمره ترکیه انجام داده اند، در بیماران نجات یافته بعد از زلزله بزرگ، همراهی

- centers. Injury 2005; 36(1): 27-32.
- 9-** Moore EE, Feliciano DV, Mattox KL. Trauma- Fifth Ed. New York Mc graw – Hill; 2004: 87-91.
- 10-** Stevenson M, Segvi Gomz M, Lescohier I, Discala C, Mc Donald Smith G. An overview of the injury severity score and new injury severity score. Inj prev 2001; 7: 10-13.
- 11-** Peek-Asa C, Kraus JF, Bourque LB, Dvimalachandra V, Yu J. Fatal and hospitalized injures resulting from the 1994 Northridge earthquake. International Journal of Epidemiology 1998; 27: 459-465
- 12-** Akbari ME, Farshad AA, Asadi-Lari M. The devastation of Bam: an overview of health issues 1 month after the earthquake. Public Health. 2004 Sep; 118(6) :403-8.
- 13-** Toker A, Isitmangil T, Erdik O, Sancakli I, Sebit S .Analysis of chest injuries sustained during the 1999 Marmara earthquake. Surg today. 2002; 32(9): 769-71.
- ۳-** جزایری ع. سوانح و بلایای طبیعی به عنوان یک معرض جهانی. مجموعه سخنرانی های جامع و میزگردهای علمی دومین کنگره بین المللی مدیریت بحران در حوادث غیرمنتقبه. چاپ اول، سپیده احرار، انتشارات شکوری. سال ۱۳۸۳.
- صفحات: ۵-۱۴
- ۴-** میرهاشمی ص، میرهاشمی اح، غنجال ع، محبی ح، دلاری ع. بررسی وضعیت امداد و انتقال در مصدومین زلزله به که در نقاھتگاه بقیه ا. (عج) و چند بیمارستان تهران بستری بودند. مجله طب نظامی سال ۱۳۸۴؛ شماره ۷(۳): ۲۲۵-۲۳۰.
- صفحات: ۶-۷
- 5-** Robert E, Fredrick C, John D. Air craft Accident Report-Avianca, the Airline of Columbia Boeing 1991; Report NTSB/AAR-91/04: 707-321 B.
- ۶-** شبکه شتابنگاری ایران وابسته به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، ویژه نامه زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بهم، زمان انتشار: دی ماه ۱۳۸۳، صفحه ۱ الی ۲.
- ۷-** به نقل از ایرنا سایت www.irna.ir - تاریخ مراجعه خداداده ۱۳۸۴
- 8-** Tahmasebi MN, Kiani K, Jalali Mazlouman Shr, Taheri A, Shahriar Kamrani R, Panjavi B. Musculoskeletal injuries associated with earthquake A report of injuries of Iran's December 26 , 2003; Bam earthquake casualties managed in tertiary referral