

آنتروپومتری پا به روشن عکس برداری دیجیتالی و اهمیت کاربرد آن در طراحی پوتین

سید باقر مرتضوی^۱, معصومه جزء‌کنعانی^۲, M.Sc, علی خوانین^۳, Ph.D, رمضان میرزایی^۴, Ph.D
یحیی رسول‌زاده^۵, Ph.D, حرم منصوری زاده^۶, Ph.D, مهناز محسنی^۷

آدرس مکاتبه: تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس،
دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره ۵، طبقه همکف، گروه پهداشت حرفه ای

تاریخ پذیرش: ۸۷/۳/۲۶ تاریخ دریافت: ۸۷/۱/۱۸

خلاصه

مقدمه: اولین مطالعات آنتروپومتری دنیا در بین نیروهای نظامی انجام گرفته است. امروزه مطالعات آنتروپومتریکی مختلفی در مورد پای انسان برای طراحی چکمه و اهداف پزشکی صورت می‌گیرد، اما در ایران بطور اختصاصی و گسترده به این امر پرداخته نشده است.

هدف: تعیین اطلاعات آنتروپومتریکی پای نمونه ای از جامعه مردان ایرانی و تبیین اهمیت کاربرد اینگونه مطالعات در طراحی پوتین

مواد و روش‌ها: در این بررسی با روشن عکس برداری دیجیتالی بوسیله دوربین عکاسی دیجیتالی تصاویر پای ۱۶۰ مرد ایرانی ۱۸ تا ۲۵ سال تهیه و توسط نرم افزار فتو آنتروپومتری، اندازه ۸ بعد پا استخراج گردید و در SPSS تحلیل آماری گردید.

نتایج: مقادیر میانگین، انحراف معیار، کوچکترین و بزرگترین اندازه‌ها، صدک‌های پنجم، پنجه‌ام و ندو پنجم ۸ پارامتر پا محاسبه شد. بعنوان مثال، میانگین \pm انحراف معیار طول، عرض و فاصله بین دو قوزک پا بترتیب $۱۳/۱۰\pm ۱۰/۱۱$ و $۱۰/۶\pm ۱۰/۸\pm ۵/۲۶۴, ۶۳$ و $۷۴/۴۷\pm ۴/۱۱$ میلی متر بدست آمد. ارتباط بین ابعاد مختلف پا، بررسی گردید و مشخص شد که بین ۸۵ درصد از ابعاد پا ارتباط معنی داری وجود دارد ($p < 0.05$).

بحث: در این مطالعه، اندازه ابعاد مهم پای نمونه ای از جامعه مردان ایرانی برای استفاده آتی در طراحی و سایزبندی پوتین بدست آمد. انجام مطالعات مشابه با لحاظ عواملی نظری نژاد، سبک زندگی و نوع شغل برای طراحی ارگonomیک و اهداف پزشکی در بین نیروهای نظامی پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پا، عکس برداری، پوتین، آنتروپومتری، نظامیان

۱- دانشجوی دکترای پهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
۲- نویسنده مسئول: کارشناس ارشد پهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- استادیار و مدیر گروه پهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۴- کارشناس ارشد پهداشت حرفه ای، انجمن ارگونومی ایران

۱- دانشیار گروه پهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسئول

۲- نویسنده مسئول: کارشناس ارشد پهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- استادیار و مدیر گروه پهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۴- استادیار گروه پهداشت حرفه ای، دانشکده پهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

گردد. در حالیکه اکثر سازمان‌های نظامی دنیا در راستای طراحی ارگونومیک و تامین تجهیزات حفاظت فردی کارامد، سرمایه گزاری هنگفتی را انجام داده اند تا میزان تلفات خویش را در جنگ کاهش دهند. این سازمانها سعی دارند با آنتروپومتری سربازان خود لباس و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را متناسب با ابعاد بدنی آنها تهیه نمایند تا علاوه بر راحتی استفاده کننده، از تهیه و تولید وسایلی که متناسب با بدن افراد نیست و نهایتاً غیر قابل استفاده خواهد بود جلوگیری نمایند. تاکنون در سطح دنیا مطالعات آنتروپومتریکی مختلفی با استفاده از روش‌های گوناگون، در مورد پای انسان برای منظورهای طراحی قالب چکمه و کفش، تعیین ارتباط بین ابعاد پا، سایز بندی و قالب گیری پا انجام گرفته است [۱۰-۱۱]. همچنین با بررسی آنتروپومتریکی بر روی ابعاد پا در هر دو حالت چکمه یا کفش پوشیده و پا بر هن، میزان تفاوت حرکت و عملکرد عضلات پا در هر دو حالت مشخص گردید و نشان داده شد که قابلیت حرکت پنجه پا بستگی به نوع چکمه دارد که با انجام اصلاحات در طراحی چکمه می‌توان این قابلیت را افزایش داد [۱۱]. از جنگ جهانی دوم به بعد اندازه گیری ابعاد بدنی در نیروهای نظامی آمریکا، روسیه، انگلیس، ژاپن، آلمان، ایتالیا، عربستان، ترکیه، تایوان و... برای منظورهای طراحی لوازم و تجهیزات نظامی، انجام پذیرفته است [۱۲]. مطالعات آنتروپومتریکی افراد نظامی ترکیه با هدف طراحی محیط کار و تجهیزات، با استفاده از دستگاه آنتروپومتر و تکنیکهای آنتروپومتریکی استاندارد، در طی سالهای ۱۹۶۳، ۱۹۶۸ و ۱۹۸۶ صورت گرفت. نتایج این طرح، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را در متغیرهای آنتروپومتری افراد مذکور با سایر جمعیتها نشان می‌داد [۱]. ابعاد سر و صورت سربازان مرد ارتش ایالت متحده آمریکا در سال ۲۰۰۵ توسط هدبورد و کولیس به منظور طراحی تجهیزات و البسه نظامی مورد نیاز اندازه گیری شد که نتایج نشان داد در اندازه برخی اجزای بدن تفاوت‌های آشکاری بین نژاد سفید و سیاه وجود دارد [۱۳]. اولین طرح اندازه گیری ابعاد بدن در ایران مربوط به سال ۱۳۴۶ می‌باشد که در نیروی زمینی ارتش توسط مستشاران خارجی به منظور طراحی مناسب پوتین و لباس نظامی انجام شد که بجز برخی نتایج نهایی سایر اطلاعات طرح موجود نیست. ارزیابی

۱- مقدمه

آنتروپومتری عبارت است از اندازه گیری ابعاد مختلف بدن و استفاده از اطلاعات به دست آمده در تعیین شکل و اندازه محل زندگی، کار، ابزار و وسایلی است که مورد استفاده انسان در مسائل مختلف نظامی، صنعتی، آموزشی، ورزشی و... قرار می‌گیرد [۱]. از جمله وسایلی که از نیازهای ضروری افراد به ویژه نظامیان می‌باشد پوتین و چکمه است که بمنظور طراحی مناسب آن باید ابعاد پای جامعه مصرف کننده در دسترس قرار گیرد. طول‌ها، عرض‌ها و ارتفاع‌های پاها باید با پوتین‌ها و چکمه‌ها سازگار باشد [۲]. پای انسان دارای ساختمان پیچیده‌ای متشکل از استخوانها، مفاصل، اعصاب و ماهیچه‌ها است و از نظر تعداد دارای یک چهارم استخوانهای بدن می‌باشد. اندازه کوچک این عضو پیچیده در مقایسه با اندازه کل بدن و این حقیقت که نقش فونداسیون حمایتی کل بدن را بر عهده دارد، بار زیادی را به آنها وارد می‌کند. هر قدمی که برداشته می‌شود وزن اضافه‌ای را به هر پا وارد می‌کند، به نحوی که در طول روز چندین تن وزن به پاها وارد می‌شود. با پوشیدن پوتین و چکمه‌های نامناسب، بدون شک شرایط فوق بدتر می‌شود [۳]. بسیاری از تغییرات پای انسان در طی گذران عمر، به دلیل استفاده از پوتین و کفش نامناسب و غیر استاندارد می‌باشد. علت بسیاری از کمردردها نیز مربوط به پوشیدن چکمه‌های نامناسب است [۴]. به منظور حمایت از ساختار پا، پیدا کردن پوتینی که به طور ارگونومیک طراحی شده باشد بسیار مهم است [۵]. نظامی گری یکی از مشاغلی است که در آن فعالیت‌های زیادی از قبیل پریدن از موانع، بالارفتن از صخره‌ها، گذر از آب، دویدن، خزیدن و غیره انجام می‌گیرد. طبیعی است که در چنین فعالیت‌هایی پوشیدن پوتین یا چکمه مناسب نقش زیادی در افزایش کارایی افراد دارد. تجربیات نظامی نشان می‌دهد که بخش عظیمی از قدرت نظامی ایران بر مبنای نیروهای نظامی است. عدم تطابق پوتین با اندازه ابعاد پای کاربر ایرانی باعث می‌شود که در عمل این تجهیزات از کارائی مطلوب برخوردار نباشند و علی‌رغم صرف هزینه‌های گزاف در سازمانهای مختلف نظامی موجب بروز عوارض در پا، اثرات روانی، عدم چالاکی، کاهش راحتی، افزایش مصرف انرژی و کاهش راندمان فرد در انجام وظایف رزمی و اتلاف سرمایه

نظامیان، اقدام به انجام تحقیق در یک محیط دانشگاهی گردید. با توجه به سهولت دسترسی به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای انجام عملیات آنتروپومتری، این دانشگاه انتخاب شد.

۲-۲- ابعاد مورد مطالعه پا

از آنجاییکه طبق بررسی‌های انجام شده در مقالات معتبر، مشخص گردید که ۸ بعد پا بیشتر از سایر ابعاد پا مورد اندازه گیری قرار گرفته اند و نیز بیشترین شکایات کاربران کفش مربوط به ناراحتی پا در این نواحی می‌باشد، لذا در این بررسی سعی شد تا به اندازه گیری این ابعاد پرداخته شود که عبارتند از: طول پا، عرض پا، ارتفاع پا، عرض پاشنه، طول پاشنه، ارتفاع مفصل متاتارسال، فاصله بین دو قوزک و ارتفاع مج پا. تعاریف مربوط به هریک از این ابعاد در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱) تعریف مربوط به هریک از ابعاد پا

| ابعاد پا | تعریف |
|-----------------------|---|
| طول پا | فاصله از نوک بلندترین انگشت تا انتهای پاشنه |
| پهنای پا | حداکثر عرض پا در پهن‌ترین قسمت |
| پهنای بین دو قوزک پا | پهنای بین برچستگی‌های استخوان‌های قوزک داخلی و خارجی پا |
| پهنای پاشنه پا | حداکثر عرض پاشنه پا از پشت و زیر برآمدگی‌های استخوان‌های قوزک |
| طول پاشنه پا | فاصله مرکز برچستگی انگشت شست تا پاشنه |
| ارتفاع مفصل متاتارسال | فاصله‌ی عمودی مفصل MPJ در انگشت شست تا کف زمین در انگشت شست |
| ارتفاع پا | فاصله عمودی نقطه محل اتصال روی پا به ساق پا تا کف زمین |
| ارتفاع مج پا | فاصله‌ی عمودی از کف زمین تا سطح حداقل محیط قسمت پایین ساق پا |

۳- تجهیزات مورد استفاده

وسایل و تجهیزات مورد استفاده در این مطالعه آنتروپومتریک شامل دوربین عکاسی دیجیتال مدل Canon-A530، پایه قرار گیری دوربین در سطح افقی (جای دوربین)، جاپای، پایه نگهدارنده دوربین، مقیاس اندازه گیری (خط کش)، برنامه نرم افزاری تعیین

شاخصهای آنتروپومتریک استاتیک دست در بین مردان ۲۰ تا ۵۰ ساله نیروهای مسلح جهت تدوین استانداردهای طراحی در سال ۱۳۷۶ به روش دستی صورت پذیرفت [۱۴]. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی مطالعه آنتروپومتریکی در سطح نیروهای مسلح کشور انجام گرفته ولی اطلاعاتی در مورد نتایج حاصله یا کاربرد آن در طراحی‌ها منتشر نشده است. بعد از این مطالعات، در ایران سابقه انجام آنتروپومتری پا بطور اختصاصی وجود نداشته و این یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به طراحان و تولید کنندگان پوتین و چکمه در داخل کشور است و به اجراء در طراحی‌ها بدون توجه به انواع قومیت‌های ایرانی از ابعاد و سایزبندی پای مربوط به مردم سایر کشورها استفاده می‌شود. با توجه به مسائل موجود در رابطه با کاربرد پوتین توسط نیروهای مسلح، الزام انجام تحقیقات مرتبط احساس می‌شود. هدف از انجام این تحقیق تعیین شاخصهای آمار توصیفی و صدکهای ابعاد پای نمونه‌ای از جامعه مردان ایرانی ۱۸ تا ۲۵ ساله و تعیین ارتباط بین اندازه ابعاد پا می‌باشد.

۲- مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع علمی-پژوهشی می‌باشد. روش مورد استفاده در آن عکس برداری دیجیتالی می‌باشد.

۲-۱- افراد شرکت کننده در مطالعه


در این پژوهش ۱۶۰ نفر از دانشجویان مرد ۱۸ تا ۲۵ ساله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از پاهای سالم برخوردار بودند شرکت کردند. از آنجایی که اندازه پا در این سنین تا حدودی ثابت می‌ماند و از طرفی افراد جوانی که در نیروهای مسلح مشغول به انجام وظیفه هستند و از پوتین استفاده می‌کنند در این رده سنی قرار می‌گیرند، این محدوده سنی برای آنتروپومتری پا انتخاب شد. افرادی با بدشکلی پا و دارای زخم و تورم از نمونه‌ها حذف شدند. از آنجایی که در محیط‌های دانشگاهی به راحتی می‌توان کارهای تحقیقاتی را توجیه نمود؛ لذا انتخاب نمونه‌ها از بین دانشجویان صورت گرفت. از طرفی با توجه به محدودیت‌های مربوط به ورود و خروج در محیط‌های نظامی، انتقال تجهیزات اندازه گیری به این محیط‌ها و نیز مشکلات مربوط به انتشار نتایج مطالعات انجام شده بر روی

بعداً امکان انجام تحقیقات بیشتر بر روی آرشیو عکس‌های گرفته شده وجود دارد. در این روش خطای فرد اندازه گیرنده حذف می‌شود. اطلاعات جمع آوری شده به طور خودکار در بانک اطلاعاتی کامپیوتر در قالب جداول Excel جمع آوری می‌شوند به طوری که آماده هر گونه تحلیل آماری هستند. این حالت منجر به دریافت و انتقال سریع اطلاعات می‌شود و هرگونه خطای انسانی ناشی از انتقال دستی داده‌ها به نرم افزارهای آماری حذف می‌شود. ولی در روش دستی زاویه دید فرد اندازه گیرنده بر روی عضو محدود است و انتقال داده‌ها از هنگام یادداشت اندازه‌ها بر روی کاغذ تا انتقال تک تک داده‌ها به صورت دستی به برنامه‌های آماری نظیر SPSS به دور از خطأ نخواهد بود. در روش عکس برداری غیردیجیتال فرد محقق باید بر روی عکس‌های چاپ شده کار اندازه گیری را با زحمت و صرف زمان زیاد انجام دهد و اندازه‌های خوانده شده را بر روی کاغذ یادداشت کند و سپس با دست به برنامه‌های آماری کامپیوتر وارد نماید. طبیعی است که علاوه بر خطای فرد اندازه گیرنده ابعاد، خطای ناشی از انتقال داده‌ها هم ایجاد می‌شود. در روش دستی ممکن است بعلت وارد شدن فشار ابزارهای اندازه گیری بر روی عضو بدن اندازه واقعی بعد دقیقاً اندازه گیری نشود ولی در روش عکس برداری دیجیتالی بعلت راحت بودن عضو این محدودیت وجود ندارد. امروزه به همین علت برای گرفتن ارتفاع قد افراد، دیگر از متر استفاده نمی‌شود بلکه از دستگاه‌های مججهز به چشم الکترونیکی استفاده می‌شود. فرد محقق به تنها یک می‌تواند بر روی تمام عکس‌های تهیه شده کار کند و بدینهی است که داده‌های بدست آمده قابلیت اطمینان بیشتری دارند. در روش‌های دستی که معمولاً توسط دو یا سه نفر انجام می‌شود سلاطیق در انتخاب نقاط آناتومیکال بدن متفاوت است و مقدار خطای بالا می‌رود. این روش را تنها با صرف یک هزینه اولیه در تامین و طراحی تجهیزات آن می‌توان بعنوان یک روش کم هزینه در آنتروپومتری استفاده کرد. در روش عکس برداری غیر دیجیتال هزینه زیادی صرف چاپ عکس‌ها به خصوص در مورد مطالعاتی با تعداد زیاد نمونه، می‌شود. از طرفی بعد از اتمام فرایند تحقیق، مشکل نگهداری تعداد زیاد نگاتیو و عکس‌های چاپ شده وجود دارد و انهدام آنها هم از نظر زیست محیطی اشکال دارد.


کننده اندازه ابعاد (فوتوانتروپومتری)، دستگاه کارت خوان و صندلی قابل تنظیم بودند.

۴-۲- روش عکس برداری دیجیتالی از ابعاد پا

آنترپومتری پای افراد در حالت بدون جوراب و کفش به روش عکس برداری دیجیتالی انجام گرفت. در این روش از فرد خواسته شد تا بر روی یک صندلی قابل تنظیم بنشیند و پای خود را بر روی محل ثابتی از جاپایی بگذارد. با توجه به ابعاد موردنظر، عکس برداری‌ها از سه وجه داخل، پشت و روی پا بوسیله دوربین عکاسی دیجیتال انجام گرفت (شکل ۱)، برای گرفتن عکس از هر وجه با توجه به بعد یا ابعاد مورد نظر اقدام به استقرار اشل (خط کش) در کنار پا می‌شد. سپس عکس‌های تهیه شده وارد حافظه کامپیوتر می‌شد و با استفاده از نرم افزار فوتو آنتروپومتری که برای این منظور طراحی شده است، اندازه ابعاد مورد نیاز از روی عکس‌ها استخراج می‌گردد (شکل ۲). آنالیز عکس‌ها بر اساس شمارش پیکسل انجام و اندازه ابعاد بر حسب میلی متر در جداول مربوطه در نرم افزار نمایش داده می‌شد. لازم به ذکر است به دلیل محسنه که این روش در مقایسه با روش‌های دستی و عکس برداری غیر دیجیتالی دارد از آن در این مطالعه استفاده شد. با عکس برداری دیجیتال می‌توان به آنتروپومتری تعداد زیادی از افراد با سرعت و دقت کافی پرداخت. با روش عکس برداری دیجیتالی می‌توان، معایب عکس‌ها در محل عکس برداری از طریق مشاهده مانیتور دوربین فوراً تشخیص داد و اقدام به تهیه مجدد آنها نمود. در حالیکه در روش دستی دیگر نمی‌توان حالت گرفتن اندازه‌ها را دوباره کنترل کرد. همچنین در عکس برداری غیر دیجیتال صرفاً بعد از چاپ عکس، معایب کار مشخص می‌شود. بدلیل زمان کوتاه و عدم تماس ابزارهای اندازه گیری با بدن، افراد تمایل بیشتری را برای همکاری با محقق دارند لذا می‌توان براحتی عکس‌ها را تهیه نمود. در روش دستی بعلت خستگی، بی طاقتی و عجله افراد نمی‌توان با آرامش کار کرد و ممکن است فرد پای خود را از حالت مطلوب خارج کند و ادامه کار با او مشکل باشد. در روش عکس برداری بعد از تهیه کلیه عکس‌ها امکان بررسی دقیقتر و راحت تر ابعاد مورد نظر از روی عکس‌ها با استفاده از نرم افزار بدون نیاز به مراجعه مجدد افراد وجود دارد و



شکل ۱) موقعیت وجوه مختلف پا در هنگام عکس برداری



شکل ۲) نرم افزار فوتو آنتروپومتری

کل نمونه‌های اصلی، با استفاده از برنامه SPSS اقدام به تعیین مقدار میانگین^۱، انحراف معیار^۲، ماکریتم و مینیمم، دامنه تغییرات اندازه‌ها، صدک^۳ پنجم، صدک پنجاهم، صدک نودوپنجم و ضریب همبستگی برای ابعاد پا گردید.

۳-نتایج

نتایج آنتروپومتری پای ۱۶۰ دانشجوی مرد ۱۸ تا ۲۵ ساله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جمع آوری شد. جدول ۲ توزیع فراوانی سنی نمونه‌های ۱۸-۲۵ سال مورد مطالعه را نشان می‌دهد. با وجود برخی محدودیت‌ها سعی شد که از هر گروه سنی تقریباً تعداد یکسانی نمونه انتخاب شود.

جدول ۳ مقادیر میانگین، انحراف معیار، دامنه تغییرات، کمترین و بیشترین اندازه به دست آمده برای ابعاد اندازه گیری شده پا را نشان می‌دهد. این جدول به خوبی نشان می‌دهد که در مورد ابعاد پای جامعه مورد بررسی، میانگین ± انحراف معیار، بیشترین و کمترین اندازه‌ها در چه محدوده‌ای قرار دارد. جدول ۴ بیانگر صدکهای پنجم، پنجاهم و نودوپنجم ابعاد اندازه گیری شده پا می‌باشد. در مورد طول پا این صدک‌ها به ترتیب شامل ۰/۰۵، ۰/۰۵، ۰/۰۵ و ۰/۰۵ میلی متر می‌باشد. در جدول ۵ ضرایب همبستگی بدست آمده بین ابعاد مختلف پا به صورت دو به دو آورده شده است و مقادیر p برای تعیین معنی دار بودن یا نبودن ارتباط بین ابعاد مختلف پا نشان داده شده است. به عنوان مثال طول پا در ۰/۰۱ ارتباط معنی داری با پهناز پا، پهناز پاشنه، طول پاشنه، فاصله بین دو قوزک، فاصله افقی بین انگشت بزرگ و کوچک و ارتفاع مج پا دارد ($p < 0/01$).

در جدول ۶ با استفاده از ضریب همبستگی، ارتباط بین اندازه ابعاد پا با سن افراد نشان داده شده است. طبق این جدول صرفاً ارتفاع مفصل متاتارسال ارتباط معنی داری را با میزان سن افراد در حد یک درصد دارد ($p < 0/01$) و در مورد سایر ابعاد چنین نیست. شکل ۳ نمودار میانگین اندازه طول پاها را در گروه‌های سنی نشان می‌دهد. طبق این نمودار بیشترین میانگین اندازه‌های طول پا مربوط به گروه

قابل ذکر است که روش آنتروپومتری مورد استفاده در این بررسی مشابه روش‌های به کار رفته در تحقیقات هوانگ (Hwang) برای آنتروپومتری ابعاد بدن افراد چینی، داس (Das) برای آنتروپومتری افراد معلولی که بر روی صندلی چرخدار می‌نشستند و مونیکا (Monica) برای آنتروپومتری کارگران، می‌باشد [۱۵ و ۱۶].

۴-روش‌های آماری

برای تعیین حجم نمونه ابتدا به صورت یک مطالعه مقدماتی (پایلوت)، آنتروپومتری ۸ بعد از ابعاد پای ۲۰ نفر از دانشجویان مرد به روش عکس برداری دیجیتالی انجام گرفت. پس از انجام آنتروپومتری، نتایج بدست آمده در نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید. سپس مقادیر میانگین و انحراف معیار داده‌های به دست آمده محاسبه شد و با در نظر گرفتن میزان خطای ۲ میلی متر بر اساس تحقیقات قبلی نظیر پژوهش‌های هوانگ (Hwang) و مونیکا (Monica) و بیشترین مقدار انحراف معیار به دست آمده از مطالعه پایلوت، با استفاده از رابطه حجم نمونه (تعداد نمونه‌ها) 140 نفر محاسبه شد. با توجه به اینکه ۸ گروه سنی در این تحقیق مورد مطالعه قرار می‌گرفتند، برای سهولت کار نمونه گیری و افزایش دقت، 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب نمونه‌ها بصورت روش نمونه گیری تصادفی خوش‌ای انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی به آنتروپومتری پای بقیه نمونه‌های اصلی انتخاب شده (160 نفر) پرداخته شد. پس از تعیین اندازه ابعاد پا در

جدول ۲) توزیع فراوانی سنی نمونه‌های ۱۸-۲۵ سال مورد مطالعه

| درصد | تعداد | گروه سنی (بر حسب سال) |
|------|-------|-----------------------|
| ۱/۲ | ۱۸ | ۱۸ |
| ۱۳/۱ | ۲۱ | ۱۹ |
| ۱۱/۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۱۱/۲ | ۱۸ | ۲۱ |
| ۱۳/۱ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۱۳/۱ | ۲۱ | ۲۳ |
| ۱۱/۸ | ۱۹ | ۲۴ |
| ۱۴/۳ | ۲۳ | ۲۵ |

1 Mean
2 Standard deviation
3 Percentile

جدول (۳) نتایج آماری کل اندازه‌گیری‌های ابعاد پا
(بر حسب میلی متر، $N=160$)

| ردیف | شاخه‌های آماری بعضی اندازه‌گیری | میانگین | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----|
| | | انحراف معیار | کوچکترین اندازه | بزرگترین اندازه | دامنه تغییرات | |
| ۱ | طول پا (FL) | ۲۶۴/۶۶ | ۱۳/۱۰ | ۲۳۱ | ۳۰۵ | ۷۴ |
| ۲ | عرض پا (FW) | ۱۰۶/۸۴ | ۵/۶۳ | ۸۶ | ۱۲۰ | ۳۴ |
| ۳ | ارتفاع پا (FH) | ۸۲/۲۵ | ۵/۵۸ | ۷۰ | ۹۶ | ۲۶ |
| ۴ | عرض پاشنه (HW) | ۷۱/۹۷ | ۴/۲۷ | ۶۳ | ۸۳ | ۲۰ |
| ۵ | طول پاشنه (HL) | ۱۸۹/۹۵ | ۱۰/۹۲ | ۱۶۵ | ۲۱۷ | ۵۲ |
| ۶ | ارتفاع منفصل متاتارسال (MH) | ۴۲/۸۳ | ۳/۲۳ | ۳۵ | ۵۲ | ۱۷ |
| ۷ | فاصله بین دو قوزک (BB) | ۷۴/۴۷ | ۴/۱۱ | ۶۶ | ۸۶ | ۲۰ |
| ۸ | ارتفاع مج (AH) | ۱۲۷/۴۴ | ۸/۸۰ | ۱۰۴ | ۱۵۶ | ۵۲ |

توضیح: عبارات مخفف لاتین داخل جدول به قرار زیر هستند:

FL= Foot length, FW= Foot width, FH= Foot height, HW= Heel width, HL= Heel length,

MH= Height of MPJ, BB= Biomlleolar breadth, AH= Ankle height

جدول (۴) صدک‌های ابعاد اندازه‌گیری شده پا (بر حسب میلی متر، $N=160$)

| ردیف | شاخه‌های آماری بعضی اندازه‌گیری | صدک پنجم | | |
|------|------------------------------------|----------------|----------|----------|
| | | صدک نود و پنجم | صدک پنجم | صدک پنجم |
| ۱ | طول پا (FL) | ۲۴۳/۰۵ | ۲۶۵ | ۲۸۶/۹۵ |
| ۲ | عرض پا (FW) | ۹۷/۰۵ | ۱۰۷ | ۱۱۵/۹۵ |
| ۳ | ارتفاع پا (FH) | ۷۳ | ۸۲ | ۹۱ |
| ۴ | عرض پاشنه (HW) | ۶۵ | ۷۲ | ۸۰ |
| ۵ | طول پاشنه (HL) | ۱۷۰ | ۱۹۰ | ۲۰۶ |
| ۶ | ارتفاع منفصل متاتارسال (MH) | ۳۸ | ۴۲ | ۴۸/۹۵ |
| ۷ | فاصله بین دو قوزک (BB) | ۶۸ | ۷۴ | ۸۱ |
| ۸ | ارتفاع مج (AH) | ۱۱۴/۰۵ | ۱۲۷ | ۱۴۱/۹۵ |

± انحراف معیار، بیشترین و کمترین اندازه‌های ابعاد پای جامعه مورد مطالعه، مشخص شد (جدول ۳). به عنوان مثال میانگین طول پای ایرانیان $۲۶۴/۶۶ \pm ۱۳/۱۰$ میلی متر و کوچکترین و بزرگترین طول پا به ترتیب ۲۳۱ و ۳۰۵ میلی متر می‌باشد. طبق جدول ۴ با توجه به صدک‌های پنجم و نود و پنجم می‌توان محدوده هر پارامتر را که شامل٪۹۰ جامعه می‌باشد تعیین نمود. صدک‌ها از سودمندترین معیارها جهت طراحی وسائل و تجهیزات می‌باشند. این معیار بیان کننده مفهومی واقعی از پراکندگی ابعادی است که بایستی در محدوده طراحی قرار گیرند و در این زمینه بهتر از مقادیر حداقل

سنی ۲۳ سال است و کمترین میانگین اندازه‌های طول پا در گروه سنی ۱۹ قرار دارد.

۴-بحث و نتیجه گیری

همانطور که قبلاً اشاره شد فقدان اطلاعات آنتروپومتریکی پا یکی از معضلات طراحان و تولید کنندگان چکمه، بوتین و کفش در کشور می‌باشد. بر این اساس سعی شد تا در این بررسی با آنتروپومتری پای دانشجویان مرد ۱۸ تا ۲۵ ساله گامی در جهت تبیین اهمیت این موضوع برداشته شود. در نتیجه این تحقیق مقادیر میانگین

جدول ۵) ارتباط بین ابعاد اندازه گیری شده پا بر اساس ماتریکس ضرایب همبستگی پیرسون

به دست آمده بین متغیرهای مورد اندازه گیری ($N=160$)

| ابعاد با همبستگی پیرسون / سطح معنی داری | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------|
| AH | BB | MH | HL | HW | FH | FW | FL | | |
| .۰/۳۳۱** | .۰/۳۹۱** | .۰/۰۸۳ | .۰/۹۳۶** | .۰/۴۱۲** | .۰/۱۹۷* | .۰/۴۶۴** | .۱/۰۰۰ | همبستگی پیرسون | FL |
| .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۲۹۴ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۱۳ | .۰/۰۰۰ | - | P Value | مقدار |
| .۰/۳۰۹** | .۰/۴۶۳** | .۰/۴۲۹** | .۰/۴۱۳** | .۰/۴۶۱** | .۰/۴۳۶** | .۱/۰۰۰ | .۰/۴۶۴** | همبستگی پیرسون | FW |
| .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | - | .۰/۰۰۰ | P Value | مقدار |
| .۰/۳۵۵** | .۰/۲۶۳** | .۰/۵۷۵** | .۰/۱۰۹ | .۰/۱۸۴* | .۱/۰۰۰ | .۰/۴۳۶** | .۰/۱۹۷* | همبستگی پیرسون | FH |
| .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۱ | .۰/۰۰۰ | .۰/۱۷۰ | .۰/۰۲۰ | - | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۱۳ | P Value | مقدار |
| .۰/۰۰۰۲ | .۰/۵۶۷** | .۰/۳۴۹** | .۰/۴۲۳** | .۱/۰۰۰ | .۰/۱۸۴* | .۰/۴۶۱** | .۰/۴۱۲** | همبستگی پیرسون | HW |
| .۰/۹۷۷ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | - | .۰/۰۲۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | P Value | مقدار |
| .۰/۲۵۱** | .۰/۳۶۴** | .۰/۰۰۶۴ | .۱/۰۰۰ | .۰/۴۲۳** | .۰/۱۰۹ | .۰/۴۱۳** | .۰/۹۳۶** | همبستگی پیرسون | HL |
| .۰/۰۰۱ | .۰/۰۰۰ | .۰/۴۲۲ | - | .۰/۰۰۰ | .۰/۱۷۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | P Value | مقدار |
| .۰/۱۵۳ | .۰/۳۷۷** | .۱/۰۰۰ | .۰/۰۰۶۴ | .۰/۳۴۹** | .۰/۵۷۰** | .۰/۴۲۹** | .۰/۰۸۳ | همبستگی پیرسون | MH |
| .۰/۰۵۴ | .۰/۰۰۰ | - | .۰/۴۲۲ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۲۹۴ | P Value | مقدار |
| .۰/۳۸۰** | .۱/۰۰۰ | .۰/۳۷۷** | .۰/۳۶۴** | .۰/۵۶۷** | .۰/۲۶۷** | .۰/۴۶۳** | .۰/۳۹۱** | همبستگی پیرسون | BB |
| .۰/۰۰۰ | - | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۱ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | P Value | مقدار |
| .۱/۰۰۰ | .۰/۳۸۰** | .۰/۱۵۳ | .۰/۲۵۱** | .۰/۰۰۰۲ | .۰/۳۵۵** | .۰/۳۰۹** | .۰/۳۳۱** | همبستگی پیرسون | AH |
| - | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۵۴ | .۰/۰۰۱ | .۰/۹۷۷ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | .۰/۰۰۰ | P Value | مقدار |

** همبستگی در $0/01$ معنی دار است.* همبستگی در $0/05$ معنی دار است.

سن و اندازه ابعاد پا وجود ندارد. نتایج جدول ۶ تایید کننده نمودار شکل ۳ می‌باشد. بر اساس نمودار شکل ۳ با توجه به اینکه اندازه طول پا در گروه سنی ۱۸ سال بیشتر از گروه ۱۹ سال است و در گروههای سنی ۲۴ و ۲۵ سال کمتر از ۲۳ سال است، نمی‌توان گفت که اندازه طول پا در این گروههای سنی با میزان سن افراد رابطه ای داشته باشد. البته می‌توان چنین اظهار نظر کرد که مردان متولد سال ۱۳۶۳ در بین متولدین سایر سالها (۱۳۶۱-۱۳۶۸) پاهای بزرگتری را دارند و بالعکس مردان متولد سال ۱۳۶۷ در بین متولدین سایر سالها (۱۳۶۱-۱۳۶۸) پاهای کوچکتری را دارند. این حالت را شاید بتوان تحت عنوان تغییر در میزان رشد بدنی مطرح نمود. از این رو یافتن دلایل اینگونه تغییرات بدنی در متولدین سال‌های مختلف، از نظر وضعیت تعذیله، انجام ورزش‌های بدنی و غیره، ضروری به نظر

و حداکثر که در یک جامعه وجود دارد عمل می‌کنند. از آنجایی که صدک‌های پنجم و نودوپنجم، تنها ۱۰ درصد افراد جامعه را در بر می‌گیرند، لحاظ آنها در طراحی‌ها می‌تواند در سفارشات منظور شود، تا تولید آنها از نظر اقتصادی به صرفه باشد. نتایج به دست آمده در جدول ۵ با توجه به ضرایب همبستگی بین ابعاد اندازه گیری شده پا نشان می‌دهد که تقریباً ۷۶ درصد مقادیر به دست آمده در حد یک درصد معنی دارهستند ($p < 0/01$)، ۶ درصد مقادیر در حد پنج درصد معنی دارند ($p < 0/05$) و ۱۵ درصد باقیمانده معنی دار نیستند ($p > 0/05$). به عبارتی بیشتر ابعاد پا (حدود ۸۵ درصد) دارای ارتباط معنی داری با یکدیگر می‌باشند. بر اساس جدول ۶ می‌توان گفت که ارتباط معنی داری بین اندازه ابعاد پا و میزان سن وجود ندارد ($p > 0/05$)، یعنی بعد از ثبت سنتین رشد، ارتباط معنی داری بین میزان


جدول ۷) نتایج آماری به دست آمده از اندازه گیری ابعاد پای مردان چینی (بر حسب میلی متر)

| ردیف | بعاد پا | میانگین | انحراف معیار | حداقل | حداکثر |
|------|---------|---------|--------------|-------|-----------|
| ۲۷۱ | ۲۲۶ | ۱۲/۳ | ۲۴۶/۷ | ۱ | طول پا |
| ۱۰۸ | ۸۴ | ۷/۴ | ۹۶/۴ | ۲ | عرض پا |
| ۱۹۷ | ۱۶۴ | ۹/۵ | ۱۷۹/۳ | ۳ | طول پاشنه |
| ۷۲ | ۵۷ | ۴ | ۶۳/۵ | ۴ | عرض پاشنه |
| ۶۷ | ۴۹ | ۵/۶ | ۵۸/۶ | ۵ | ارتفاع پا |

جدول ۶) ارتباط بین سن افراد و اندازه ابعاد پا ($N=160$)

| بعاد پا | همبستگی پیر سون | سطح معنی داری (مقدار P) |
|---------|-----------------|-------------------------|
| . /۱۷۲ | . /۱۰۸ | FL |
| . /۱۷۳ | . /۱۰۸ | FH |
| . /۲۴۱ | . /۰۹۳ | FW |
| . /۱۳۴ | . /۱۱۹ | HW |
| . /۲۳۸ | . /۰۹۴ | HL |
| . /۰۰۱ | . /۲۶۲** | MH |
| . /۴۶۵ | . /۰۵۸ | BB |
| . /۱۶۸ | -. /۱۰۹ | AH |

** همبستگی در ۰/۰۱ معنی دار است.



شکل ۳) نمودار میانگین اندازه طول پا و سن افراد نمونه

طبیعی است که محصولات کشور چین بر اساس نتایج آنتروپومتری مردم چین طراحی شده اند. در مطالعه حاضر مقادیر به دست آمده برای این ابعاد، یکی از اولین اطلاعات آنتروپومتریکی برای پای مردان ایرانی است. این امید وجود دارد که اطلاعات به دست آمده اساسی برای انجام مطالعات بزرگتر به منظور به دست آوردن یکی از این ابعاد مخاطب پای ایرانیان باشد. با توجه به کاربرد وسیع انواع پوتین و چکمه، نیاز پای ایرانیان باشد. با توجه به کاربرد وسیع انواع پوتین و چکمه، نیاز به اندازه گیری ابعاد مختلف پای نظامیان ایرانی در جامعه بزرگتر، در گروههای مختلف سنی، در انواع اقوام ایرانی و در انواع مشاغل و رسته‌های نظامی وجود دارد تا از نتایج به دست آمده در طراحی و

می‌رسد. با توجه به اینکه امروزه روند استفاده از بوشاک و به ویژه چکمه‌های چینی در کشور رو به فزونی نهاده است به منظور مقایسه اندازه ابعاد پا در این دو ملت، نتایج آنتروپومتری تعدادی از ابعاد پای مردان چینی در گروههای سنی ۱۹ تا ۲۳ ساله را که در سال ۲۰۰۶ توسط چانا (Channa) و همکارانش انجام شده است، در جدول ۷ آورده شده است [۱۰]. از مقایسه نتایج اندازه گیری پنج بعد پا در مردان ایرانی ۱۸ تا ۲۵ ساله و مردان چینی ۱۹ تا ۲۳ ساله، مشخص شد که ابعاد پای مردان ایرانی بزرگتر از ابعاد پای مردان چینی است. با توجه به این نتایج، پر واضح است که استفاده از لوازم و تجهیزاتی که ویژه مردم چین طراحی شده است، برای ایرانیان مناسب نیست.

سایز بندی مناسب و ارگونومیک انواع چکمه، پوتین و دیگر تجهیزات مرتبط با پا برای نیروهای مسلح ایران استفاده شود.

منابع

- ۱- موعودی محمد امین. مهندسی آنتروپومتری. چاپ اول، مازندران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ ۱۳۷۵، صفحات ۲۱-۴۵.
- ۲- عبدالی ارمکی محمد. مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار. چاپ اول؛ تهران: انتشارات امید مجده؛ ۱۳۷۸، صفحات ۲۷۵-۳۰۷.
- ۳- موعودی محمد امین، چوبینه علیرضا. ارگونومی در عمل و جستارهای برگزیده ارگونومی. چاپ اول، تهران: مرکز نشر؛ ۱۳۷۸، صفحات ۲۶۰-۲۱۶.
- ۴- Monica P, Pedro M, Luis G, Costa A. Anthropometric study of Portuguese workers. *Int J Industrial Ergonomics* 2005; 35: 401-410.
- ۵- <http://www.doctorsexercise.com,Foot Health>
- ۶- یزدچی م. استاندارد کفش. ویژه نامه استاندارد و سلامت ۱۳۸۶؛ سال اول، شماره دوم؛ صفحه ۹.
- ۷- Simon H. What makes a good boot? www.extremities-performance.com, Extremities Performance Research Group, Department of Design & Technology,Loughborough University,2006.
- ۸- Cheng FT, Perng D B. A systematic approach for developing a foot size information system for shoe last design. *Int J Industrial Ergonomics* 1999; 25: 171-185.
- ۹- Goonetilleke R.S., Fanho E. C. , Richard H. Y. Foot Anthropometry in Hong Kong. Department of Industrial Engineering & Engineering Management, Hong Kong University of Science and Technology2003.
- ۱۰- Channa P, Xiong S, Ravindra S, Zhao J. Foot measurements from three-dimensional scans: A comparison and evaluation of different methods. *Int J Industrial Ergonomics* 2006; 36: 789-807.
- ۱۱- Kadambande S, Khurana A, Debnath M, Bansa M, Hariharan K. Comparative anthropometric analysis of

پیشنهادها

باقطه به اهمیت و کاربرد وسیع انواع پوتین و چکمه برای نیروهای مسلح، پیشنهاد می شود که ابعاد مختلف پای نظامیان ایرانی در جامعه بزرگتر، در گروههای مختلف سنی، در انواع اقوام ایرانی و در انواع مشاغل و رسته های نظامی به منظور به دست آوردن بانک عظیم تر اطلاعات آنتروپومتریکی پای ایرانیان اندازه گیری شود تا از نتایج به دست آمده در طراحی ارگونومیک و سایز بندی مناسب انواع چکمه، پوتین و دیگر تجهیزات مرتبط با پا برای نیروهای مسلح ایران استفاده شود. پیشنهاد می شود که این قبیل مطالعات آنتروپومتری درمورد تمام ابعاد بدنی نیروهای مسلح کشور در قالب برنامه های منظم به صورت هر چند سال یکبار انجام پذیرد و عوامل تاثیرگذار بر اندازه ابعاد بدنی نظیر نوع نژاد، شرایط آب و هوایی و محل زندگی، سبک زندگی، نوع برنامه غذایی و نوع شغل افراد به طور جامع بررسی شود و تغییر اندازه های ابعاد بدنی در بین نسلهای مختلف برای اهداف پزشکی و طراحی محیط کار، ابزار و وسائل مناسب و ارگونومیک جامعه ایرانی به ویژه نظامیان، مطالعه گردد. با توجه به محسن یاد شده در مورد روش عکس برداری دیجیتالی، این روش برای آنتروپومتری افراد نظامی پیشنهاد می گردد. با عنایت به ظهور روش های نوین آنتروپومتری در دنیا، ضروریست که در داخل کشور ایران هم با اختصاص هزینه لازم از سوی سازمانهای ذیربط، روش های عکس برداری دو و سه بعدی و درنتیجه آنتروپومتری دینامیک در راستای کاربردی کردن آنتروپومتری مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه اینکه با توجه به اهمیت اساسی و لزوم کاربرد آنتروپومتری در طراحی تجهیزات نظامی، استفاده از این روشها در سازمانهای نظامی پیشنهاد می گردد.

تشکر و قدردانی

از گروه محترم بهداشت حرفة ای دانشگاه تربیت مدرس که در مراحل مختلف این پژوهش مساعدت فرمودند تقدیر و تشکر می شود.

shod and unshod feet. The Foot 2006 (in press).

۱۲- فیزنت استفان، انسان، آنתרופومتری، ارگونومی و طراحی، چوبینه علیرضا،

- موعودی محمدامین، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، کتاب ماد؛ ۱۳۷۵؛ صفحات ۱۵۵-

.۱۲۱

13- Yokota M. Head and facial anthropometry of mixed-race US Army male soldiers for military design and sizing. Applied Ergonomics 2005; 36: 379-83.

۱۴- گزیده ای از مباحث آنתרופومتری، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ ۱۳۸۱؛

صفحات ۱-۴۵.

15- Hwang W., Static anthropometry of civilian chines in Taivan using computer analyzed photography. Human Factors 1990; 32: 359-70.

16- Das B., Kozey J.W. Structural anthropometric measurements for wheelchair mobile adults. Applied Ergonomics 1999; 30: 385-90

