

اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن

علبدین تققی‌پور^{*}, مهدی نوروزی^۱, نازنین ضیاء شیخ‌الاسلامی^۲, رضا مصطفوی^۳

^{*} مرکز بهداشت استان قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

^۱ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

^۲ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

^۳ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف: تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی است که توسط کنه به انسان منتقل می‌شود. سایر راههای انتقال این ویروس به انسان شامل تماس با خون و بافت‌های حیوان در کشتارگاه‌ها و تماس بیمارستانی است. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت روند اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به CCHF در استان قم انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی تمامی بیمارانی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با تشخیص آزمایشگاهی بیماری CCHF پیگیری و درمان شده بودند، انجام شد. داده‌ها با استفاده از جدول فراوانی و آزمون مجدول کای یا تست دقیق فیشر به کمک نرم‌افزار SPSS تحلیل شد.

یافته‌ها: طی سال‌های مورد مطالعه ۳۴ بیمار مشکوک در استان قم تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند. از این تعداد ۹ مورد (۲۶/۵٪) قطعی و ۱۱ مورد (۳۲/۵٪) محتمل بودند و ۱۴ نفر (۴۱٪) فقط برخی از علایم را داشتند. میزان مرگ و میر ناشی از موارد قطعی بیماری ۲۲٪ بود. شایع‌ترین گروه سنی مبتلایان، افراد ۱۵ تا ۳۵ سال (۷۰/۵٪) بودند و بیشترین موارد بیماری (۹۱/۲٪) در مناطق شهری سکونت داشتند. شغل اکثر بیماران خانه‌دار، دامدار، دانش‌آموز و قصاب بود و ۸۵٪ بیماران سابقه تماس با دام را ذکر کردند.

نتیجه‌گیری: CCHF در استان قم بهویژه در نواحی شهری آندمیک بوده و افرادی که با دام سروکار دارند، خصوصاً قصاب‌ها و کارگران کشتارگاه‌ها و دامداران در معرض خطر این بیماری قرار دارند. بنابراین ضرورت توجه خاص مسئولان بهداشتی و درمانی در این رابطه احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو، اپیدمیولوژی، کنه، ویروس CCHF

Epidemiologic status of the patients with Crimean Congo Hemorrhagic Fever and its associated risk factors

Saghafipour A.* MSPH, Norouzi M.^۱ MSc, Zia Sheikholeslami N.^۲ PhD, Mostafavi R.^۳ MD

*Qom Province Health Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

^۱Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

^۲Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

^۳Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Aims: Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a viral disease transmitted to human by ticks and contact with the blood or animal tissues and hospital contacts are the other ways of its transmission. This research was done to determine the epidemiologic trend of CCHF patients in Qom province.

Methods: This descriptive-analytical study was performed on all patients diagnosed, treated and followed with the laboratory diagnosis of CCHF from 2001-2011. The data were analyzed by Chi-square test or Fisher's exact test using SPSS 17 software.

Results: 34 suspected cases of CCHF were diagnosed, treated and followed during the studied years. 9 cases (26.5%) were confirmed, 11 cases (32.5%) were probable and the rest 14 cases (41%) only had some symptoms. The mortality rate of the confirmed cases was 22%. The most frequent age group was 15-35 years (70.5%) and most of the cases (91.3%) resided in urban areas. Most of patients were house wives, farmers, students and butchers and 85% of patients mentioned the history of contact with livestock.

Conclusion: CCHF is endemic in Qom province, especially in urban areas. Those exposed to livestock particularly butchers and slaughter house workers and farmers are at the risk of this disease; therefore there is the need for health and treatment authorities' special care in this field.

Keywords: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Epidemiology, Tick, CCHF Virus

مقدمه

هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو و عوامل مرتبط با آن در استان قم طی سال‌های ۱۳۸۰-۹۰ بود.

روش‌ها

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که از اول فروردین ۱۳۸۰ تا پایان تیر ۱۳۹۰ در استان قم انجام شد، کلیه ۳۴ بیمار مشکوک به بیماری CCHF که با تشخیص آزمایشگاهی تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند، بررسی شدند.

کمیته فنی کشوری بهمنظور ایجاد هماهنگی در نظام مراقبت و ثبت بیماری، سه تعریف زیر را ارایه داده است:

الف- مورد مشکوک: داشتن علایم خونریزی، تب و درد عضلانی به همراه سابقه اپیدمیولوژیک (سابقه گرش با کنه یا له کردن کنه با دست، تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافت‌های دام یا حیوانات بیمار، تماس مستقیم با خون و ترشحات یا مواد دفعی بیمار قطعی با مشکوک به CCHF و اقامت یا مسافرت در محیط روستایی که احتمال تماس با دام‌ها یا کنه وجود داشته باشد).

ب- مورد محتمل: مورد مشکوک به همراه ترومیوسیتوپنی (پلاکت کمتر از ۱۵۰ هزار در میلی متر مکعب) و لکوپنی (گلbul سفید کمتر از ۴ هزار در میلی متر مکعب) یا لکوسیتوز (گلbul سفید بیش از ۶ هزار در میلی متر مکعب).

ج- مورد قطعی: موارد محتمل به علاوه آزمون سرولوژیک مثبت یا جداکردن ویروس از بدن بیمار [۱، ۹، ۵، ۱۰].

براساس توصیه کمیته فنی کشوری، موارد مشکوک از کلیه مراکز بهداشتی- درمانی، درمانگاه‌ها و مطب‌های خصوصی به بیمارستان ارجاع داده می‌شوند. چنانچه پس از معاینات و آزمایشات لازم بیمار جزو موارد محتمل قرار گیرد، ضمن درمان مقتضی و گزارش تلفنی به مراکز ذی‌ربط، نمونه خون فرد به انتستیتو پاستور ایران ارسال می‌شود. در نهایت، نتیجه آزمایشات سرولوژیک به مرکز مدیریت بیماری‌ها در وزارت بهداشت و مراکز بهداشت استان‌ها و شهرستان ارسال می‌شود. سپس در مرکز بهداشت شهرستان، خصوصیات دموگرافیکی بیماران نظیر سن، شغل، محل سکونت، تاریخچه احتمالی تماس با منابع انتشار عفونت و نتایج آزمایشگاهی بهمنظور بررسی‌های اپیدمیولوژیک ثبت می‌شود.

پس از اخذ موافقت از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، اطلاعات مربوط به بیماران بدون ذکر نام و نام خانوادگی از طریق فرم استاندارد وزارت بهداشت جمع‌آوری شد. این اطلاعات از فرم‌های خلاصه اطلاعات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران که توسط کارکنان مبارزه با بیماری‌ها ثبت شده بودند، استخراج شد. معیار ورود افراد به مطالعه، ثبت دقیق و کامل اطلاعات بیماران در فرم‌های بررسی مربوطه (مورد تایید مرکز مدیریت

تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو (CCHF) توسط ویروسی از خانواده بونیا ویریده (*Bunya viride*) ایجاد می‌شود. این بیماری در مناطق اندمیک از طریق کنه هیالوما و تماس با دام‌های آلوود و افراد بیمار به دیگران منتقل می‌شود [۱، ۲، ۳، ۴]. علایم اولیه بیماری شامل شروع ناگهانی تب، حال عمومی بد، ضعف، تحریک‌پذیری، درد شدید اندام‌ها و کمر، سردرد و بی‌اشتهاای است. استفراغ، درد شکمی و اسهال نیز در بعضی موارد دیده می‌شود. لکوپنی همراه با لنفوپنی شایع‌تر از نوتروپنی است. ترومیوسیتوپنی نیز شایع است. ممکن است برافروختگی، پرخونی حلق، خایرات پوستی در قفسه سینه و ملتحمه و ایناتیم‌های خونریزی دهنده در کام نرم، اوولا و حلق و پیش‌هایی که از تن به تمام بدن انتشار می‌یابند و پورپوراهای گسترده دیده شود. تب ۵ تا ۱۲ روز ادامه پیدا می‌کند و نیز ممکن است دومرحله‌ای بوده، در مرحله همولیز قطع شود. مرحله خونریزی دهنده در روز پنجم بیماری شروع می‌شود و یک تا ۱۰ روز طول می‌کشد. خونریزی از لثه، بینی، ریه، رحم و روده در موارد شدید و کشنده با حجم زیاد و غالباً همراه با ضعف تحریب کبدی دیده می‌شود. دوره نقاوت، طولانی و همراه با احتیاط است. بهبودی معمولاً بدون عارضه بوده و مرگ‌ومیر ۲ تا ۵٪ است [۵].

این بیماری برای اولین بار در سال ۱۹۴۴ در کریمه‌روسیه دیده شد [۶، ۷]. سپس در سال ۱۹۵۶ موارد مشابه آن در کنگو گزارش شد. در سال ۱۹۶۹ مشخص شد که عامل این دو بیماری یک ویروس است [۸]. این بیماری در بعضی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی به صورت اندمیک وجود دارد [۱].

بهمنظور بررسی سیمای اپیدمیولوژیکی بیماری در برخی از نقاط ایران، مطالعاتی صورت گرفته است. در بررسی‌های انجام‌شده توسط بیرونی و همکاران، ۷ نمونه از ۲۹۷ نمونه گرفته شده از ساکنان استان سیستان و بلوچستان از نظر آزمون الایزا (IgG) برعلیه CCHF مثبت بودند [۹]. این امر نشان‌دهنده اندمیک بودن بیماری در استان سیستان و بلوچستان است. همچنین در مطالعه سرولوژیکی تلمادره‌ای و همکاران در سال ۱۳۸۴ در شهرستان قاین (استان خراسان جنوبی)، حدود ۷۹٪ گوسفندان دارای آنتی‌بادی IgG مثبت علیه CCHF بوده‌اند و آلوودگی در کنه‌ها بهمیزان ۶/۶٪ اعلام شده است [۸].

استان قم یکی از قطب‌های دامپروری در کشور محسوب می‌شود و محل ترازیت دام‌های وارداتی از مرزهای شرقی کشور به مناطق مرکزی و استان‌های غربی و شمال غربی است که بعضاً به طور قاچاق وارد می‌شوند. از آن‌جا که در مبادی شرقی کشور امکانات قرنطینه و معاینه دام‌ها وجود ندارد و همچنین همه‌ساله موارد نسبتاً ثابتی (۱ تا ۲ نفر) از بیماری در این استان گزارش می‌شود، بنابراین استان قم از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، یکی از مناطق آندمیک بیماری CCHF در کشور اعلام شده است [۵].

بیمارستان‌ها و ۲ نفر (۵/۹٪) را مراکز بهداشتی - درمانی ارجاع و گزارش داده بودند.

بیشترین موارد بیماری مربوط به چهارماهه اول سال ۱۳۹۰ بود (۵ مورد ابتلای قطعی و یک مورد مرگ). همچنین یک مورد ابتلای قطعی در سال ۸۱، یک مورد مرگ و ۲ مورد ابتلای قطعی در سال ۸۲ و یک مورد ابتلای در سال ۸۷ گزارش شده بود.

میزان شیوع عالیم بیماری در افراد مورد مطالعه در جدول ۱ بیان شده است. از نظر برخی عالیم آزمایشگاهی، در ۲۴ نفر (۷۰/۶٪) از بیماران تروموبستوتونی مشاهده شد. همچنین ۳ نفر (۰/۸٪) افزایش آنزیمهای کبدی و ۴ نفر (۱۱/۸٪) عالیم هماجوری را نشان دادند.

جدول ۱) میزان شیوع عالیم در بیماران مبتلا به CCHF

درصد	تعداد	عالیم
۹۷/۱	۳۳	تب
۷۹/۴	۲۷	خونریزی
۱۰۰	۳۴	درد عضلات
۵۸/۸	۲۰	تهوع و استفراغ
۳۸/۲	۱۳	لکپنی
۳۵/۳	۱۲	خونریزی وسیع پوستی
۱۱/۸	۴	اختلال هوشیاری

از نظر اقدامات درمانی، تمام ۳۴ بیمار ریپاویرین دریافت کرده بودند. علاوه بر ریپاویرین، ۴ نفر (۱۱/۸٪) پلاسماء، ۱۰ نفر (۲۹/۴٪) پلاکت و ۸ نفر (۲۳/۵٪) آنتی‌بیوتیک دریافت کرده بودند و برای ۱۲ نفر (۰/۳۵٪) از آنها ریپاویرین به همراه سایر داروها (مثل کورتیکواستروئیدها و آدرنالین) تجویز شده بود.

جدول ۲) توزیع فراوانی افراد مبتلا براساس جنسیت، عالیم شایع بالینی و سابقه تماس به تفکیک موارد بیماری (قطعی، محتمل، مشکوک)

موارد بیماری ←	قطعی	محتمل	مشکوک	متغیر ↓
تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	
(۲۳/۵) ۸	(۲۳/۵) ۸	(۲۳/۵) ۸	مرد	جنسيت
(۱۷/۶) ۶	(۸/۸) ۳	(۲/۹) ۱	زن	
(۴۲) ۱۴	(۳۲/۳) ۱۱	(۲۳/۵) ۸	تب	عالیم بالینی
(۲۳/۵) ۸	(۳۲/۳) ۱۱	(۲۳/۵) ۸	خونریزی	
(۴۱/۲) ۱۴	(۳۲/۳) ۱۱	(۲۶/۵) ۹	درد عضلانی	شایع
(۱۴/۷) ۵	(۸/۸) ۳	(۵/۹) ۲	کنه	
(۸/۸) ۳	(۵/۹) ۲	(۵/۹) ۲	بیمار مشکوک	سابقه تماس
(۱۷/۶) ۶	(۱۷/۶) ۶	(۱۴/۷) ۵	حیوان آلوده	

توزیع فراوانی افراد مبتلا براساس جنسیت، سابقه تماس و عالیم شایع بالینی به تفکیک موارد بیماری (قطعی، محتمل، مشکوک) در جدول ۲ آورده شده است. بین سابقه تماس با کنه، حیوان آلوده و بیمار مشکوک با تعاریف موارد اپیدمیولوژیک بیماری، رابطه معنی‌داری

بیماری‌های وزارت بهداشت) بود.

برای مقایسه متغیرهای کمی، در ابتدا با استفاده از آزمون کولمگروف-اسمیرنوف، نرمال‌بودن توزیع داده‌ها بررسی شد. سپس با توجه به نرمال‌بودن توزیع داده‌ها آزمون ANOVA مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین رابطه متغیرهای کیفی نیز از آزمون مجدور کای یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد. آنالیزهای فوق به وسیله نرم‌افزار آماری 17 SPSS انجام شد.

نتایج

از ۳۴ مورد مشکوک، ۹ مورد (۲۶/۵٪) قطعی و ۱۱ مورد (۳۲/۳٪) محتمل تشخیص داده شدند. ۱۴ نفر بقیه (۴۱/۲٪) فقط برخی از عالیم مورد مشکوک را داشتند. از بین این افراد، ۳۲ نفر (۹۴/۱٪) سلامت خود را بازیافتند، ولی ۲ نفر (۰/۵٪) علی‌رغم اقدامات مراقبتی و حمایتی فوت کردند.

۲۴ نفر (۷۰/۶٪) از افراد مورد مطالعه، مرد بودند. ۷ نفر (۲۰/۶٪) از مبتلایان زیر ۱۵ سال، ۲۴ نفر (۷۰/۶٪) ۱۵ تا ۳۵ سال و ۳ نفر (۸/۸٪) بالای ۳۵ سال بودند. از بین افراد مبتلا، ۵ نفر (۱۴/۷٪) قصاب، ۸ نفر (۲۳/۵٪) دامدار، ۹ نفر (۴/۵٪) خانه‌دار، ۸ نفر (۰/۲۳٪) محصل و ۴ نفر (۱۱/۸٪) دارای مشاغل آزاد بودند که یک مورد از آنها دچار عفونت بیمارستانی شده بود. این فرد، مراقب یکی از بیماری شده بود.

از نظر فصل ابتلا به بیماری نیز ۱۲ نفر (۳۵/۳٪) در بهار، ۲۱ نفر (۶۱/۸٪) در تابستان و یک نفر (۲/۹٪) در پاییز مبتلا شده بودند و هیچ موردی در فصل زمستان گزارش نشده بود. ۳۳ نفر (۹۷/۱٪) از بیماران ملیت ایرانی داشتند و یک نفر (۰/۲۹٪) غیرایرانی (افغانی) بود. همچنین ۳۱ نفر (۹۱/۲٪) ساکن شهر و ۳ نفر (۰/۸٪) ساکن روستا بودند.

۱۷ نفر (۵/۰٪) از بیماران از طریق تماس با دام مبتلا شده بودند که نفر (۰/۵٪) از آنها اقدام به ذبح دام کرده بودند، ۴ نفر (۱۱/۸٪) با گوشت و ترشحات تازه دام تماس داشتند و در نهایت ۲ نفر (۰/۵٪) با دام زنده سروکار داشتند. نکته جالب توجه این که ۹ نفر دیگر (۰/۲۶٪) ترکیبی از راههای انتقال فوق را ذکر نمودند. همچنین ۷ نفر (۰/۲۰٪) با بیمار مشکوک تماس داشتند و هیچ گونه سابقه تماس با دام را بیان نکردند. بین نوع تماس با حیوان آلوده و بیماری CCHF ارتباط معنی‌دار مشاهده شد ($p < 0.05$). ۱۰ نفر (۰/۲۹٪) نیز سابقه تماس با کنه داشتند که از این تعداد ۵ نفر (۱۴/۷٪) مورد گزش کنه قرار گرفته بودند و ۵ نفر (۱۴/۷٪) اقدام به دست‌کاری کنه یا لکردن کنه نموده بودند. هیچ کدام از بیماران آلودگی با دام و کنه به طور مشترک را بیان نکردند.

۲ نفر (۰/۵٪) از بیماران را مطب‌های خصوصی، ۳۰ نفر (۸۸/۲٪) را

مشاهده شد ($p=0.03$). میانگین سنی بیماران قطعی $13/33 \pm 11/24$ سال، بیماران محتمل $63/10 \pm 6/23$ سال و بیماران مشکوک $8/28 \pm 8/23$ سال بود. از نظر سنی، تفاوت معنی داری بین موارد مبتلا به CCHF (قطعی، محتمل، مشکوک) وجود نداشت ($p>0.05$).

بحث

بیماری CCHF از سال ۱۳۷۸ در ایران شناخته شده است. از سال ۱۳۸۱ اولين مورد بیماری در استان قم شناسایی شد. آگاهی کارکنان بهداشتی و درمانی و پزشکان منطقه در خصوص این بیماری در سطح نسبتاً خوبی است. لذا موارد مشکوک سریعاً بهمنظور بسترسی و اقدامات تشخیصی و درمانی، معرفی و ارجاع داده می شوند.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری مسری است که میزان مرگ و میر آن به 30% نیز می رسد [۱]. میزان کشنده بیماری در این مطالعه حدود 22% به دست آمد؛ یعنی از 9 نفر موارد قطعی مبتلا به CCHF، 2 نفر فوت کرده بودند. میزان کشنده ناشی از این بیماری در ترکیه 12% ، در خراسان رضوی 15% [۲]، در زاهدان 20% [۳]، در پاکستان بین 15% تا 45% [۴] و در افغانستان 60% [۵] گزارش شده است.

در این پژوهش، تعداد بیماران مرد بیشتر از زن بود. این امر می تواند بهدلیل مسایل شغلی باشد که باعث می شود مردان بیشتر از زنان در معرض گزش کنند و تماس با محصولات دامی آلوده باشند. در پژوهش های انجام شده در مناطق مختلف کشور، اکثریت بیماران مبتلا به CCHF را مردان تشکیل داده بودند [۵]. به طور مثال در پژوهش اوسی اسکویی و همکاران 80% بیماران مرد بودند و میزان مرگ و میر بیماری نیز در این مطالعه 8% بوده است [۶].

در این پژوهش 29 نفر ($85/3\%$) با دام تماس داشتند. 10 نفر ($29/4\%$) سابقه تماس با کنه داشتند که از این تعداد 5 نفر مورد گزش کنند قرار گرفته بودند. در مطالعات انجام شده در استان سیستان و بلوچستان نیز نتایج مشابهی به دست آمده است [۲].

برخلاف انتظار که همواره قصابان، دامداران و کشاورزان به بیماری مبتلا می شوند [۵]، در این مطالعه زنان خانه دار، داشت آموزان و کارکنان بیمارستانی نیز از جمله مبتلایان بودند. همه گیری های بیمارستانی بیماری CCHF در بعضی نقاط از جمله ترکیه [۱۲]، پاکستان [۱۵] و امارات متحده عربی [۱۷] گزارش شده است. موارد دیگر انتقال بیمارستانی در پاکستان گزارش شده است که عموماً در جراحان و کارکنان اتفاق عمل که با بیمار مبتلا در حین عمل تماس داشته اند، اتفاق افتاده است [۱۸]. یکی از بیماران در این بروزی نیز بهعلت پرستاری از بیمار، مبتلا شده بود. از آن جایی که انتقال بیمارستانی این عفونت در این مطالعه و مطالعات مشابه [۱۸، ۱۵] به اثبات رسیده است، لازم است در مورد بیمارانی که با تشخیص احتمالی CCHF بستری شده اند، احتیاطات استاندارد رعایت شود.

نتیجه گیری

بیماری CCHF در استان قم مخصوصاً در نواحی شهری، آندیمیک است و افرادی که با دام سروکار دارند، به خصوص قصابها و کارگران کشتارگاهها و دامداران در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.

- 9- Mums.ac.ir [homepage on the Internet]. Tehran: c1998 [cited 2009 Apr]. Crimean-congo hemorrhagic fever. Available from: <http://www.mums.ac.ir/hasheminegad/fa/amozesh>. [Persian]
- 10- Iranpet.net [homepage on the Internet]. Tehran: c2009 [cited 2010 Jun]. Crimean-congo hemorrhagic fever. Available from: <http://wwwiranpet.net/wb/?P=1644/13>. [Persian]
- 11- Pezeshk.us [homepage on the Internet]. Tehran: c2007 [cited 2008 Aug]. Available from: <http://www.pezeshk.us/?P=14345/2008>. [Persian]
- 12- Cdc.gov [homepage on the Internet]. Atlanta: c2009 [cited 2009 Mar]. Emerging infectious diseases: Crimean-congo hemorrhagic fever virus in high-risk population, Turkey. Available from: <http://www.cdc.gov/eid>
- 13- Ebadi Azar F, Esmaeili R, Zohoor A. The assessment of the epidemiologic status of the patients with Crimean-congo hemorrhagic fever and its associated risk factors in Khorasan Razavi province. *Iran Med Sci J*. 2011;21(1):61-6. [Persian]
- 14- Sharifi-Mood B, Metanat M, Ghorbani-Vaghei A, Fayyaz-Jahani F, Akrami E. The outcome of patient with Crimean-congo hemorrhagic fever in Zahedan, Southeast of Iran: A comparative study. *Arch Iran Med*. 2009;12:151-3. [Persian]
- 15- Pirkani GS, Jogezaei EK. Crimean-congo hemorrhagic fever: A survey of cases of CCHF in Baluchestan. *Prof Med J*. 2007;14:17-21. [Persian]
- 16- Owaysee Oskooei H, Eini P, Eizadi M, Nasirghli F, Saravani S. Assessment of patients with Crimean-congo hemorrhagic fever admitted in Amir-Almomenin hospital of Zabol from 2003 to 2005. *Mil Med J*. 2007;9(4):305-6. [Persian]
- 17- Zavitsanou A, Babatsikou F, Koutis C. Crimean-congo hemorrhagic fever: An emerging tick-borne disease. *Health Sci J*. 2009;3(1):10-8.
- 18- Maechel A, Pilaca A. Crimean-congo hemorrhagic fever: A case on nosocomial transmission. *Infection*. 2005;33(4):295-6.
- 19- Saijo M, Tang Q, Shimayi B, Han L, Zhang Y, Asiguma M, et al. Possible horizontal transmission of Crimean-congo hemorrhagic fever virus from a mother to her child. *Jpn J Infect Dis*. 2004;57(2):55-7.

بنابراین ضرورت توجه خاص مسئولان بهداشتی و درمانی در این رابطه احساس می شود.

تشکر و قدردانی: بدین وسیله از همکاری صمیمانه کارکنان گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم قدردانی می نماییم.

منابع

- 1- World Health Organization. Crimean-congo haemorrhagic fever, fact sheet No. 208. *Jpn J Infect Dis*. 2006;59:326-8. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/print.html>
- 2- Izadi S, Holakouie-Naieni K, Majdzadeh SR, Chinikar S, Nadim A, Rakhshani F. Seroprevalence of Crimean-congo hemorrhagic fever in Sistan-Baluchestan province of Iran. *Jpn J Infect Dis*. 2006;59(5):326-8.
- 3- CCHF. Crimean-congo Hemorrhagic Fever, 1998- 2001 [research project]. Iran: Control of Communicable Disease Center; 2001. [Persian]
- 4- Athar MN, Khalid MA, Ahmad AM, Bashir N, Baqai HZ. Crimean-congo hemorrhagic fever outbreak in Rawalpindi, Pakistan, 2002: Contact tracing and risk assessment. *Am J Trop Med Hyg*. 2005;22(4):471-3.
- 5- Ministry of Health and Medical Education. Control of communicable disease center. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2006 [Persian]
- 6- Leshchinskaya EV. Crimean hemorrhagic fever. *Trudy Inst Polio Virus Entsef Akad Med Nauk*. 1965;7:226-36.
- 7- Casals J, Henderson BE, Hoogstraal H, Johnson KM, Shelyakov A. A review of soviet viral hemorrhagic fevers, 1969. *J Infect Dis*. 1970;122:437-53.
- 8- Davari M. A geographical distribution survey on CCHF positive antibody oven's of Ghaien city. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2005. [Persian]